

УП.02.02. Инфекционные заболевания и беременность

Занятие №8. ВИЧ-инфекция и беременность.

Тесты

1. Возбудителем СПИДа является

- 1) бактерия
- 2) риккетсия
- 3) вирус
- 4) кокк

2. Вероятность рождения ВИЧ-инфицированного ребенка от ВИЧ-инфицированной матери:

- 1) 100%
- 2) 15-50%
- 3) 80%
- 4) 0 %

3. Впервые вирус СПИДа был выделен в

- 1) 1980 г.
- 2) 1981 г.
- 3) 1982 г.
- 4) 1983 г.

4. Источником передачи СПИДа является

- 1) больной СПИДом человек ВИЧ-инфицированный
- 2) кровь, лимфа, сперма, женское молоко
- 3) вирус иммунодефицита
- 4) реконвалесцент

5. Основной путь передачи при ВИЧ-инфекции

- 1) половой
- 2) парентеральный
- 3) трансмиссивный
- 4) контактно-бытовой

6. Инкубационный период при СПИДе в среднем составляет

- 1) 12-36 часов
- 2) 2-3 недели
- 3) 6 месяцев
- 4) от 3 недель до 1 года

7. На 1-й стадии ВИЧ-инфекции обнаруживаются симптомы, подобные

- 1) кандидомикозу
- 2) мононуклеозу
- 3) опоясывающему лишаю
- 4) паразитарным заболеваниям

8. СПИД наиболее распространен в возрастной группе

- 1) до 5 лет
- 2) 5-19 лет
- 3) 20-49 лет
- 4) 50-70 лет

9. Основными симптомами СПИДа у взрослых являются

- 1) а) потеря веса — 10% от веса тела
б) хроническая диарея
в) продолжительная лихорадка — не менее одного месяца
- 2) а) генерализованная лимфаденопатия
б) рецидивирующий опоясывающий герпес
в) упорный кашель на протяжении месяца
- 3) а) глоточно-ротовой кандидоз
б) простой герпес
в) генерализованная лимфаденопатия
- 4) а) генерализованный зудящий дерматит
б) глоточно-ротовой кандидоз
в) опоясывающий герпес

10. Для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции применяют следующие методы лабораторной диагностики

- 1) микроскопия в темном поле
- 2) бактериологический метод
- 3) иммунологический метод
- 4) фазово-контрастный метод