

Занятие №4. Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности.

Тесты

1 подгруппа

1. Степень сужения таза при истинной конъюгате 10 см
 - а) 1
 - б) 2
 - в) 3
 - г) 4
2. Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки 35 см. Предполагаемый вес плода (в граммах)
 - а) 3500
 - б) 3200
 - в) 3000
 - г) 3800
3. Синклитическое вставление головки — это расположение
 - а) малого родничка на одинаковом расстоянии от лона до мыса
 - б) стреловидного шва на одинаковом расстоянии от лона до мыса
 - в) большого родничка по оси таза
 - г) стреловидного шва в прямом размере таза
4. Передний асинклитизм — это
 - а) расположение стреловидного шва ближе к мысу, первой вставляется передняя теменная кость
 - б) расположение стреловидного шва ближе к симфизу
 - в) первой вставляется задняя теменная кость
 - г) первыми опускаются ягодицы
5. Выпадению пуповины способствует
 - а) гипоксия плода
 - б) отсутствие пояса внутреннего прилегания
 - в) слабость родовой деятельности
 - г) узкий таз
6. К ранним гестозам беременных относится
 - а) гипертония
 - б) рвота беременных
 - в) гипотония
 - г) протеинурия
7. При рвоте беременных тяжелым осложнением является
 - а) бессонница
 - б) запоры
 - в) обезвоживание организма
 - г) понижение температуры
8. Основной метод лечения рвоты беременных
 - а) лечение экстрагенитальных заболеваний
 - б) инфузионная терапия

- в) седативная терапия
 - г) физиотерапия
9. Для гестоза беременных характерно
- а) повышение массы тела
 - б) гипергликемия
 - в) нарушение микроциркуляции в жизненно-важных органах
 - г) гипотония
10. Для ранних гестозов беременных характерно
- а) гипотония
 - б) анемия
 - в) отеки
 - г) гиперсаливация
11. Фактором риска развития позднего гестоза беременных является
- а) гипертоническая болезнь
 - б) возраст первородящей 25 лет
 - в) вторые роды
 - г) поперечное положение плода
12. При начавшейся преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты у роженицы с поздним гестозом показано
- а) стимулирование родовой деятельности
 - б) применение гипотензивных средств
 - в) введение реополиглюкина
 - г) срочное родоразрешение операцией кесарево сечение
13. Поздний гестоз беременных — это осложнение, возникающее
- а) только во время беременности
 - б) при высоком содержании пролактина
 - в) при опухоли яичников
 - г) при воспалении придатков матки
14. Для эклампсии характерно
- а) наличие тонических и клонических судорог
 - б) отсутствие судорожного синдрома
 - в) высокая температура
 - г) запах ацетона изо рта
15. Ревматизм — это заболевание
- а) паразитарное
 - б) инфекционно-аллергическое
 - в) гормональное
 - г) наследственное