

**Занятие №5. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Особенности ведения родов при аномалиях родовой деятельности, аномалиях таза. Оказание помощи при многоплодной беременности.**

**Тесты**

**2 подгруппа**

1. Тактика акушера при интимном прикреплении плаценты
  - а) наружный массаж матки
  - б) холод на низ живота
  - в) ручное отделение плаценты
  - г) применение метода Абуладзе
2. Для ущемления последа характерно
  - а) отсутствие признаков отделения плаценты
  - б) наличие признаков отделения плаценты
  - в) отсутствие кровотечения
  - г) гипертония
3. Тактика акушера при ущемлении последа
  - а) потягивание за пуповину
  - б) проведение наружного массажа матки
  - в) внутривенное введение окситоцина
  - г) проведение наружных приемов выжимания последа Абуладзе, Гентера, Креде-Лазаревича
4. Кровотечение в раннем послеродовом периоде обусловлено чаще
  - а) гипотонией матки
  - б) нарушением отделения плаценты
  - в) нарушением системы свертывания крови
  - г) разрывом матки
5. Гипотония матки в послеродовом периоде чаще всего обусловлена
  - а) перерастяжением матки (многоводие, многоплодие, крупный плод)
  - б) отсутствием аборт в анамнезе
  - в) наличием гипертонии
  - г) анемией
6. Для лечения гипотонии матки применяют
  - а) аскорбиновую кислоту
  - б) глюкозу
  - в) метилэргометрин, окситоцин
  - г) сульфат магния
7. Для проявлений геморрагического шока характерна
  - а) гипотония
  - б) протеинурия
  - в) брадикардия
  - г) полиурия
8. При геморрагическом шоке основные мероприятия направлены на
  - а) снижение АД
  - б) восполнение объема циркулирующей крови

- в) определение уровня гемоглобина
  - г) исследование функции почек
9. Для улучшения микроциркуляции внутривенно показано введение
- а) гепарина
  - б) реополиглюкина
  - в) эуфиллина
  - г) хлористого кальция
10. При разрыве промежности второй степени происходит
- а) разрыв стенки уретры
  - б) повреждение костей таза
  - в) повреждение мышц промежности
  - г) повреждение сфинктера прямой кишки
11. При разрыве промежности первой степени швы накладывают на
- а) слизистую влагалища
  - б) кожу промежности
  - в) мышцы промежности
  - г) сфинктер ануса
12. Причина возникновения разрывов влагалища в родах
- а) вторые роды
  - б) стремительное течение родов
  - в) преждевременные роды
  - г) эпизиотомия
13. Причины разрыва матки во время беременности
- а) клинически узкий таз
  - б) анатомически узкий таз
  - в) крупный плод
  - г) несостоятельность послеоперационного рубца на матке после операции кесарева сечения
14. К разрыву матки предрасполагает
- а) рубец на матке после операции "кесарево сечение"
  - б) предлежание плаценты
  - в) многоводие
  - г) гестозы
15. При длительности менструального цикла 28 дней его следует считать
- а) нормопонирующим
  - б) антепонирующим
  - в) постпонирующим
  - г) гиперпонирующим