

Занятие №5. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Особенности ведения родов при аномалиях родовой деятельности, аномалиях таза. Оказание помощи при многоплодной беременности.

Тесты

1 подгруппа

1. Тактика акушера при интимном прикреплении плаценты
 - а) наружный массаж матки
 - б) холод на низ живота
 - в) ручное отделение плаценты
 - г) применение метода Абуладзе
2. Для ущемления последа характерно
 - а) отсутствие признаков отделения плаценты
 - б) наличие признаков отделения плаценты
 - в) отсутствие кровотечения
 - г) гипертония
3. Тактика акушера при ущемлении последа
 - а) потягивание за пуповину
 - б) проведение наружного массажа матки
 - в) внутривенное введение окситоцина
 - г) проведение наружных приемов выжимания последа Абуладзе, Гентера, Креде-Лазаревича
4. Кровотечение в раннем послеродовом периоде обусловлено чаще
 - а) гипотонией матки
 - б) нарушением отделения плаценты
 - в) нарушением системы свертывания крови
 - г) разрывом матки
5. Гипотония матки в послеродовом периоде чаще всего обусловлена
 - а) перерастяжением матки (многоводие, многоплодие, крупный плод)
 - б) отсутствием аборт в анамнезе
 - в) наличием гипертонии
 - г) анемией
6. Для лечения гипотонии матки применяют
 - а) аскорбиновую кислоту
 - б) глюкозу
 - в) метилэргометрин, окситоцин
 - г) сульфат магния
7. Для проявлений геморрагического шока характерна
 - а) гипотония
 - б) протеинурия
 - в) брадикардия
 - г) полиурия
8. При геморрагическом шоке основные мероприятия направлены на
 - а) снижение АД
 - б) восполнение объема циркулирующей крови

- в) определение уровня гемоглобина
 - г) исследование функции почек
9. Для улучшения микроциркуляции внутривенно показано введение
- а) гепарина
 - б) реополиглюкина
 - в) эуфиллина
 - г) хлористого кальция
10. При разрыве промежности второй степени происходит
- а) разрыв стенки уретры
 - б) повреждение костей таза
 - в) повреждение мышц промежности
 - г) повреждение сфинктера прямой кишки
11. При разрыве промежности первой степени швы накладывают на
- а) слизистую влагалища
 - б) кожу промежности
 - в) мышцы промежности
 - г) сфинктер ануса
12. Причина возникновения разрывов влагалища в родах
- а) вторые роды
 - б) стремительное течение родов
 - в) преждевременные роды
 - г) эпизиотомия
13. Причины разрыва матки во время беременности
- а) клинически узкий таз
 - б) анатомически узкий таз
 - в) крупный плод
 - г) несостоятельность послеоперационного рубца на матке после операции кесарева сечения
14. К разрыву матки предрасполагает
- а) рубец на матке после операции "кесарево сечение"
 - б) предлежание плаценты
 - в) многоводие
 - г) гестозы
15. При длительности менструального цикла 28 дней его следует считать
- а) нормопонирующим
 - б) антепонирующим
 - в) постпонирующим
 - г) гиперпонирующим