

Занятие №6. Акушерское кровотечение.

Тесты

1 подгруппа

1. Рождение последа после рождения плода происходит в норме через
 - а) 5-20 минут
 - б) 30-40 минут
 - в) 1 час
 - г) 3 часа
2. Продолжительность послеродового периода с момента рождения последа
 - а) 6-8 недель
 - б) 4-6 недель
 - в) 2-3 недели
 - г) 1-3 недели
3. Причины наступления родов
 - а) формирование родовой доминанты
 - б) накопление гормона прогестерона
 - в) перерастяжение шейного канала
 - г) накопление пролактина
4. Продолжительность нормальных родов у первородящих
 - а) 2-3 часа
 - б) 6-7 часов
 - в) 12 - 18 часов
 - г) 24-26 часов
5. Процессы в первом периоде родов
 - а) отделение плаценты от стенок матки и выделение последа
 - б) рождение плода
 - в) раскрытие шейного канала
 - г) потуги
6. Период раскрытия шейки матки при первых родах продолжается
 - а) 5-6 часов
 - б) 12-14 часов
 - в) 24 часа
 - г) 2 суток
7. Головка плода прорезывается при заднем виде затылочного предлежания размером
 - а) прямым
 - б) малым косым
 - в) вертикальным
 - г) средним косым
8. Признак отделения плаценты по Шредеру
 - а) удлинение наружного отрезка пуповины
 - б) отклонение дна матки выше пупка вправо
 - в) втягивание пуповины при надавливании ребром ладони над симфизом
 - г) удлинение пуповины при покашливании

9. Признак отделения плаценты по Альфельду
 - а) удлинение наружного отрезка пуповины
 - б) отклонение дна матки выше пупка вправо
 - в) втягивание пуповины при надавливании ребром ладони над симфизом
 - г) удлинение пуповины на выдохе
10. Способы выделения отделившегося последа
 - а) Чукалова
 - б) Креде-Лазаревича
 - в) Шредера
 - г) Соловьева
11. Признак начала родов
 - а) появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей
 - б) отхождение околоплодных вод
 - в) усиление шевеления плода
 - г) регулярные сокращения матки каждые 10-12 минут
12. Преждевременное отхождение околоплодных вод — это отхождение вод
 - а) до начала родовой деятельности
 - б) одновременно с рождением плода
 - в) при полном раскрытии
 - г) после рождения плода
13. Преждевременное отхождение околоплодных вод может вызвать
 - а) нарушение мочеиспускания
 - б) стремительные роды
 - в) инфицирование матки и плода
 - г) задержку стула после родов
14. Период изгнания плода при первых родах длится обычно
 - а) 1-2 часа
 - б) 3 часа
 - в) 4 часа
 - г) 15 минут
15. К предвестникам родов относятся
 - а) отхождение околоплодных вод
 - б) частое мочеиспускание
 - в) нерегулярные сокращения матки
 - г) кровянистые выделения из половых путей