

Занятие №6. Акушерское кровотечение.

Тесты

2 подгруппа

1. У первородящих
 - а) раскрытие шейки матки происходит с наружного зева
 - б) раскрывается внутренний зев, сглаживается шейка матки, раскрывается наружный зев
 - в) оба зева открываются одновременно
 - г) раскрытие происходит после отхождения околоплодных вод
2. Своевременное отхождение околоплодных вод происходит
 - а) при полном или почти полном открытии маточного зева
 - б) в начале раскрытия шейки матки
 - в) при опущении головки плода в полость малого таза
 - г) при появлении потуг
3. Физиологическая кровопотеря в родах (мл)
 - а) 600.0
 - б) 400.0
 - в) 250.0
 - г) 500.0
4. Сократительная активность миометрия стимулируется
 - а) простогландами
 - б) прогестероном
 - в) пролактином
 - г) папаверином
5. Началом родовой деятельности следует считать
 - а) излитие околоплодных вод
 - б) прижатие головки ко входу в малый таз
 - в) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
 - г) опущение головки в полость малого таза
6. Точка, вокруг которой происходит разгибание головки плода, называется
 - а) точкой фиксации
 - б) проводной точкой
 - в) ведущей точкой
 - г) фокусирующей точкой
7. При нормальных родах в переднем виде затылочного предлежания головка поворачивается затылком кпереди и стреловидный шов стоит в прямом размере
 - а) на тазовом дне
 - б) при входе в малый таз
 - в) в широкой части малого таза
 - г) в узкой части малого таза
8. Второй период родов начинается с момента
 - а) полного раскрытия шейки матки
 - б) начала потуг
 - в) опускания головки до 3-ей плоскости таза

- г) отхождения околоплодных вод
- 9. Головка прорезывается при переднем виде затылочного предлежания размером
 - а) прямым
 - б) малым косым
 - в) средним косым
 - г) вертикальным
- 10. Проводной точкой при переднем виде затылочного предлежания является
 - а) большой родничок
 - б) малый родничок
 - в) подзатылочная ямка
 - г) подбородок
- 11. Точкой фиксации при разгибании головки в случае переднего вида затылочного предлежания является
 - а) подзатылочная ямка
 - б) граница волосистой части
 - в) малый родничок
 - г) середина стреловидного шва
- 12. Роженице не рекомендуется тужиться
 - а) при прорезывании теменных бугров
 - б) сразу после рождения головки
 - в) при наружном повороте головки
 - г) при врезывании головки
- 13. Сердцебиение плода во втором периоде родов выслушивается при головном предлежании
 - а) над лобком
 - б) на уровне пупка
 - в) чуть ниже пупка со стороны позиции
 - г) выше пупка
- 14. Культия пуповины после наложения скобки обрабатывается
 - а) 5% раствором марганцево-кислого калия
 - б) раствором йода
 - в) 0,02% раствором марганцево-кислого калия
 - г) раствором фурацилина
- 15. Удлинение наружного отрезка пуповины на 10 см в последовом периоде называется признаком отделения последа
 - а) по Альфельду
 - б) по Шредеру
 - в) по Штрассману
 - г) по Гентеру