

**Занятие №7. Акушерский травматизм. Разрывы матки и родовых путей.  
Накладывание швов и уход за ними.**

**Тесты**

**2 подгруппа**

1. Причины нарушений отделения плаценты
  - а) нарушение функций желудочно-кишечного тракта
  - б) интимное прикрепление плаценты
  - в) повышение АД
  - г) отечность нижних конечностей
2. Симптом предлежания плаценты
  - а) боли в животе
  - б) кровотечение из половых путей
  - в) гипоксия плода
  - г) признаки позднего гестоза
3. Диагностика предлежания плаценты
  - а) ультразвуковое исследование
  - б) прослушивание сердцебиения плода
  - в) гормональные реакции
  - г) кольпоскопия
4. При плотном прикреплении плаценты ворсины хориона проникают в
  - а) функциональный слой слизистой
  - б) базальный слой слизистой
  - в) миометрий
  - г) периметрий
5. При приращении плаценты характерно врастание ворсин хориона в
  - а) базальный слой слизистой
  - б) миометрий
  - в) функциональный слой слизистой
  - г) параметрий
6. Причина преждевременной отслойки плаценты
  - а) миома матки
  - б) киста яичника
  - в) гипертония беременной
  - г) гипотония беременной
7. Симптом преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты
  - а) гипотония матки
  - б) гипоксия плода
  - в) нарушение зрения
  - г) нарушение мочеиспускания
8. Предлежание плаценты можно предполагать в случае
  - а) родового излития вод
  - б) болей в низу живота

- в) несоответствия головки размерам таза
  - г) кровянистых выделений из половых путей
9. Причиной интимного прикрепления плаценты может быть
- а) ментроэндометриит
  - б) гестоз
  - в) перерастяжение стенок матки
  - г) пузырный занос
10. К кровотечению в раннем послеродовом периоде предрасполагают
- а) слабость родовой деятельности
  - б) узкий таз
  - в) гидроцефалия плода
  - г) неправильное положение плода
11. Для профилактики кровотечения в родах в момент прорезывания головки вводят внутривенно
- а) прогестерон
  - б) метилэргометрин
  - в) прегнантол
  - г) маммофизин
12. Патологическая кровопотеря в раннем послеродовом периоде требует в первую очередь
- а) введения спазмолитиков
  - б) введения сокращающих матку средств
  - в) введение обезболивающих средств
  - г) ампутации матки
13. Для кровотечения при предлежании плаценты характерны
- а) внезапность возникновения
  - б) постоянность
  - в) болезненность
  - г) кровь темная со сгустками
14. Наиболее информативным в диагностике преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты являются
- а) наружное акушерское исследование
  - б) амниоскопия
  - в) ультразвуковое исследование
  - г) оценка сердечной деятельности плода
15. При кровотечении в 3 периоде родов и наличии признаков отделения плаценты необходимо проведение
- а) наружного массажа матки
  - б) ручного отделения плаценты
  - в) выделения последа наружными приемами
  - г) введения сокращающих матку средств