

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи.

Занятие №9. Лечение нарушений менструальной функции. Аномалии развития репродуктивной системы. Лечение аномалий положения женских половых органов

Тесты (выберите один правильный вариант)

2 подгруппа

1. Пробное выскабливание полости матки показано при подозрении на
 - а) рак тела матки
 - б) метроэндометрит
 - в) миому матки
 - г) седловидную матку
2. Физиологическая аменорея характерна для
 - а) состояния после ампутации матки
 - б) периода лактации
 - в) после грубого выскабливания полости матки
 - г) синдрома Штейна- Левенталья
3. Кюретка — инструмент применяемый для
 - а) зондирования матки
 - б) выскабливания полости матки
 - в) пункции заднего свода влагалища
 - г) кольпоскопии
4. Основной метод остановки дисфункционального маточного кровотечения у девочек
 - а) введение кровоостанавливающих, сокращающих средств и гормональный гемостаз
 - б) применение мужских половых гормонов
 - в) выскабливание полости матки с последующим гистологическим исследованием
 - г) ампутация тела матки
5. Гипофизарная аменорея возникает в результате
 - а) некроза гипофиза
 - б) кровенаполнения сосудов гипофиза
 - в) воспалительных заболеваний женских половых органов
 - г) длительного полового воздержания
6. Феномен папоротника используют при подозрении на
 - а) эндоцервицит
 - б) гипофункцию яичников
 - в) беременность
 - г) рак тела матки
7. Причиной альгодисменореи является
 - а) ретроверзия матки
 - б) цистит
 - в) кольпит
 - г) гиперплазия эндометрия
8. Ациклические кровотечения — это
 - а) кровотечения связанные с менструацией

- б) кровотечения, связанные с гипоплазией эндометрия
 - в) симптом рака гениталий у женщин
 - г) ановуляторные кровотечения
9. Климактерический синдром обусловлен нарушениями
- а) органов мочевыделительной системы
 - б) опорно -двигательного аппарата
 - в) обменно-эндокринными
 - г) желудочно-кишечными
10. Для предменструального синдрома характерны
- а) повышение АД
 - б) головокружение
 - в) набухание молочных желез
 - г) олигурия
11. Тест измерения базальной температуры основан на гипертермическом эффекте
- а) эстрадиола
 - б) простогландинов
 - в) прогестерона
 - г) питуитрина
12. Основной критерий двухфазного менструального цикла
- а) правильный ритм менструации
 - б) своевременное наступление первой менструации
 - в) овуляция
 - г) нормальное количество менструальных выделений
13. Для лечения климактерического синдрома применяют гормоны
- а) фолликулин
 - б) климен
 - в) тестостерон-пропионат
 - г) 17 - ОПК
14. Для генитального инфантилизма характерно
- а) узкое, длинное влагалище
 - б) менструальный цикл установился в 12 лет по 3-4 дня через 26 дней умеренные безболезненные
 - в) соотношение шейки матки к телу матки 1 : 3
 - г) детородная функция в норме
15. Преждевременное половое созревание возникает при наличии
- а) феминизирующей опухоли яичников
 - б) миомы матки
 - в) инфантилизма
 - г) менструальный цикл установился в 17 лет, нерегулярный
16. При опущении матки наружный зев находится
- а) на уровне интерспинальной линии
 - б) ниже интерспинальной линии
 - в) за пределами половой щели

- г) дно матки находится на уровне верхнего края симфиза
17. Опушению и выпадению половых органов способствуют
- а) частые половые контакты
 - б) нарушение целостности мышц тазового дна
 - в) длительное лечение гормонами
 - г) эрозия шейки матки
18. При аномалиях развития матки возникает
- а) бесплодие
 - б) многоплодие
 - в) перекрут ножки кистомы
 - г) трихомонадный кольпит
19. При ювенильных кровотечениях необходимо
- а) наблюдение
 - б) применение гормонального гемостаза
 - в) антибактериальная терапия
 - г) применение анальгетиков
20. Для стимуляции овуляции применяют
- а) клофелин
 - б) клостилбегит
 - в) метилтестостерон
 - г) оксипрогестерон капронат