

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №10. Лечение специфических и неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1. Группа риска женщин по развитию воспалительных заболеваний
 - а) не живущие половой жизнью
 - б) работающие в детских учреждениях
 - в) ведущие беспорядочную половую жизнь
 - г) здоровые женщины
2. Первичный очаг гонореи:
 - а) уретра
 - б) влагалище
 - в) шейка матки
 - г) бартолиновые железы
3. Пути проникновения возбудителя гонореи
 - а) воздушно-капельный
 - б) половой
 - в) бытовой
 - г) контактный
4. При проведении химической провокации у больных с хроническим аднекситом применяют
 - а) 10% раствор хлористого натрия
 - б) раствор хлорамина
 - в) раствор люголя с глицерином
 - г) раствор фурацилина
5. Для лечения кандидозного кольпита применяют
 - а) пенициллин
 - б) дибазол
 - в) осарсол
 - г) пимафуцин
6. Возбудителем трихомониаза являются
 - а) дрожжеподобные грибки (кандиды)
 - б) хламидии
 - в) кокки
 - г) простейшие, относящиеся к классу жгутиковых
7. Восходящая гонорея — это поражение
 - а) бартолиновых желез
 - б) влагалища
 - в) матки и маточных труб
 - г) уретры
8. Распространение гонорейной инфекции происходит путем
 - а) лимфогенным
 - б) гематогенным

- в) контактным
 - г) интраканаликулярным (восходящим)
9. Характер белей при гонорее:
- а) пенистые с запахом
 - б) гнойные, желтого цвета
 - в) с примесью крови
 - г) творожистые
10. Диспансерное наблюдение за больными гонореей проводится в течение
- а) 1 месяца
 - б) 2 месяцев
 - в) 3 месяцев
 - г) 4 месяцев
11. В патогенезе воспалительных заболеваний женских половых органов особое значение имеет
- а) отсутствие полового партнера
 - б) рабочее место женщины
 - в) наличие раневых входных ворот
 - г) климатические условия
12. Отсутствие влагалища — это
- а. дисплазия
 - б) аплазия
 - в) олигурия
 - г) кольпит
13. При опущении матки
- а) дно матки находится на уровне плоскости входа в малый таз
 - б) тело матки находится за пределами половой щели
 - в) внутренний зев матки находится ниже интерспинальной линии
 - г) внутренний зев находится выше интерспинальной линии
14. Влагалищная часть шейки матки покрыта в норме эпителием
- а) цилиндрическим
 - б) мерцательным
 - в) многослойным плоским
 - г) железистым
15. К фоновым заболеваниям шейки матки относится
- а) трихомонадный кольпит
 - б) псевдоэрозия
 - в) сальпингофорит
 - г) папиллома
16. Для лечения псевдоэрозии применяют
- а) присыпки
 - б) диатермоконизацию
 - в) прижигание солковагином
 - г) влагалищное орошение