

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №10. Лечение специфических и неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1. Возбудители специфических воспалительных заболеваний женских половых органов
 - а) стрептококки
 - б) гонококки, трихомонады
 - в) кишечные палочки
 - г) стафилококки
2. Противогрибковые антибиотики
 - а) нистатин, леворин
 - б) эритромицин
 - в) сульфадимезин
 - г) тетрациклин
3. Характер белей при трихомониазе
 - а) творожистые
 - б) гнойные
 - в) пенистые, с неприятным запахом
 - г) жидкие бесцветные
4. Способствующим фактором для возникновения воспаления женских половых органов является
 - а) нерациональная диета
 - б) нарушение барьерных механизмов
 - в) применение тепловых процедур
 - г) нарушение режима труда и отдыха
5. Возбудители хламидиоза имеют свойства
 - а) бактерий
 - б) бактерий и вирусов
 - в) вирусов
 - г) анаэробов
6. Первичным очагом нисходящей гонореи чаще является
 - а) влагалище
 - б) преддверие влагалища
 - в) уретра
 - г) вульва
7. Препаратом выбора при лечении хламидиоза является
 - а) пенициллин
 - б) азитромицин
 - в) оксациллин
 - г) гентамицин
8. Преимущественный путь распространения гонорейной инфекции
 - а) лимфогенный
 - б) гематогенный

- в) интраканаликулярный
 - г) смешанный
9. Показанием для зондирования полости матки является подозрение на
- а) аднексит
 - б) эндометриоз
 - в) двурогую матку
 - г) кисту яичника
10. Основные клинические признаки, характерные для нисходящей гонореи
- а) тошнота и рвота
 - б) боли в животе
 - в) жидкий стул
 - г) рези и боли при мочеиспускании
11. Пирогенная реакция возникает после провокации
- а) алиментарной
 - б) физиологической
 - в) биологической (введение гоновакцины и пирогенала)
 - г) термической
12. Провокацию применяют для
- а) выявления гонококков в острой стадии гонореи
 - б) для лечения гонореи
 - в) для профилактики гонореи
 - г) для диагностики подострой и хронической формы гонореи
13. Окончательный диагноз гонореи может быть поставлен на основании
- а) клинических признаков
 - б) обнаружения в мазке гонококков
 - в) анамнеза
 - г) бимануального исследования
14. Для острого гонорейного сальпингоофорита характерны
- а) многоочаговость поражения
 - б) двухстороннее поражение придатков матки
 - в) симптомы интоксикации
 - г) симптомы поражения функций соседних органов
15. Для лечения генитального герпеса применяют
- а) полижинакс
 - б) зовиракс
 - в) золадекс
 - г) трихопол
16. Основной путь заражения трихомонадным кольпитом
- а) контактный
 - б) воздушно-капельный
 - в) алиментарный
 - г) половой