

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №10. Лечение специфических и неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1. Осложнением хламидиоза может быть
 - а) цистит
 - б) невынашивание, бесплодие
 - в) меноррагия
 - г) миома матки
2. Характерное клиническое проявление неспецифического вульвовагинита
 - а) боль в нижних отделах живота
 - б) зуд во влагалище и промежности
 - в) ациклические кровянистые выделения
 - г) затруднение при мочеиспускании
3. Нарушение проходимости маточных труб может быть следствием
 - а) неспецифического вульвовагинита
 - б) трихомонадного кольпита
 - в) бартолинита
 - г) генитального хламидиоза
4. Наиболее частые осложнения восходящей гонореи
 - а) гиперменструальный синдром
 - б) бесплодие
 - в) аменорея
 - г) невынашивание беременности
5. Лечение больных с острой гонореей включает
 - а) антибиотикотерапию
 - б) специальную диету
 - в) санаторно-курортное лечение
 - г) физиотерапию
6. Для лечения гонореи применяются препараты
 - а) гормональные
 - б) антибиотики
 - в) бета-адреноблокаторы
 - г) наркотики
7. Наиболее часто выявляют туберкулез внутренних половых органов в периоде
 - а) детства
 - б) начала половой жизни
 - в) климактерическом
 - г) половой зрелости
8. Для лечения трихомониаза применяют
 - а) данол
 - б) трихопол

- в) ампициллин
 - г) климен
9. Признаки болезней, передающихся половым путем
- а) нарушение желудочно - кишечного тракта
 - б) боль и жжение при мочеиспускании
 - в) видимые изменения в половых органах
 - г) изменения функции ЦНС
10. При туберкулезе чаще всего поражаются
- а) маточные трубы
 - б) наружные половые органы
 - в) влагалище
 - г) шейка матки
11. Туберкулезом гениталий женщины заболевают чаще в периоде
- а) детства
 - б) половой зрелости
 - в) менопаузы
 - г) полового созревания
12. При туберкулезе половых органов первичный очаг наиболее часто локализуется в
- а) легких
 - б) костях
 - в) мочевыделительной системе
 - г) печени
13. Основной клинический симптом туберкулезного поражения матки
- а) гиперменструальный синдром
 - б) первичное бесплодие
 - в) боли внизу живота
 - г) жидкие водянистые бели
14. Группа риска женщин по развитию воспалительных заболеваний
- а) не живущие половой жизнью
 - б) работающие в детских учреждениях
 - в) ведущие беспорядочную половую жизнь
 - г) здоровые женщины
15. Первичный очаг гонореи:
- а) уретра
 - б) влагалище
 - в) шейка матки
 - г) бартолиновые железы
16. Пути проникновения возбудителя гонореи
- а) воздушно-капельный
 - б) половой
 - в) бытовой
 - г) контактный