

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №12. Хирургические методы лечения гинекологических больных. Предоперационная подготовка.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1 подгруппа

1. Симптом начавшегося аборта
 - а) боли в эпигастральной области
 - б) цервикальный канал закрыт
 - в) плодное яйцо отслоилось полностью
 - г) кровянистые выделения из половых путей
2. Симптом аборта в ходу
 - а) схваткообразные боли внизу живота
 - б) цервикальный канал закрыт
 - в) плодное яйцо отслоилось на небольшом участке
 - г) обильные бели
3. Апоплексия яичника — это
 - а) воспаление яичника
 - б) перекрут ножки кисты яичника
 - в) разрыв ткани яичника
 - г) резкий спазм яичниковой артерии
4. Разрыв беременной трубы нужно дифференцировать с
 - а) острой пневмонией
 - б) гастритом
 - в) холециститом
 - г) острым аппендицитом, апоплексией яичника, острым аднекситом
5. Внематочная беременность может локализоваться во всех перечисленных органах, кроме
 - а) яичников
 - б) шейки матки
 - в) матки
 - г) брюшной полости
6. Наиболее частой причиной внематочной беременности является
 - а) длительное половое воздержание
 - б) хронический сальпингит
 - в) применение гормональных контрацептивов
 - г) частые половые контакты
7. Симптом нарушенной внематочной беременности по типу трубного аборта
 - а) нарушение перистальтики кишечника
 - б) боли внизу живота
 - в) профузное маточное кровотечение
 - г) задержка стула и газов
8. Симптом нарушенной внематочной беременности по типу разрыва маточной трубы
 - а) внезапный приступ болей в животе

- б) положительный симптом Пастернацкого
 - в) матка соответствует по величине сроку задержки менструации
 - г) затруднение при мочеиспускании
9. При тяжелом состоянии больной с прервавшейся трубной беременностью показано
- а) наблюдение дежурной медицинской сестры, сокращающиеся средства, холод на низ живота
 - б) безотлагательное удаление беременной трубы, являющейся источником кровотечения, гемостаз и гемотранфузия
 - в) назначение анальгетиков, спазмолитиков
 - г) строгий покой
10. Основой клинический симптом внутреннего кровотечения
- а) артериальная гипотония
 - б) артериальная гипертония
 - в) частая рвота
 - г) вздутие кишечника
11. Наиболее информативный метод диагностики апоплексии яичника
- а) определение хорионического гонадотропина в моче
 - б) пункция брюшной полости через задний свод влагалища
 - в) лапароскопия
 - г) бимануальное исследование
12. К методам функциональной диагностики относят
- а) определение уровня гормонов в крови
 - б) измерение базальной температуры
 - в) определение белка в моче
 - г) рентгенологическое исследование
13. Помощь при неполном аборте
- а) введение спазмолитиков
 - б) пункция через задний свод влагалища
 - в) строгий постельный режим
 - г) выскабливание полости матки
14. Пластические операции на шейке матки противопоказаны при
- а) подозрении на злокачественный процесс в области шейки матки
 - б) нарушении обменных процессов
 - в) после удаления одной трубы
 - г) длительной гормональной терапии
15. Операция экстирпации матки отличается от надвлагалищной ампутации матки удалением
- а) верхней трети влагалища
 - б) параметральной клетчатки
 - в) шейки матки
 - г) подвздошных лимфатических узлов