

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №12. Хирургические методы лечения гинекологических больных. Предоперационная подготовка.

Тесты (выберите один правильный вариант).

2 подгруппа

1. Признаки, характерные для прерывания внематочной беременности по типу разрыва маточной трубы
 - а) обильное маточное кровотечение
 - б) признаки анемизации
 - в) высокая температура
 - г) повышение АД
2. Признаки, характерные для апоплексии яичника
 - а) начало заболевания в первые дни после менструации
 - б) кровянисто-гнойные выделения из половых путей
 - в) задержка менструации
 - г) острые боли внизу живота
3. Наиболее часто встречается форма внематочной беременности
 - а) яичниковая
 - б) трубная
 - в) брюшная
 - г) шейная
4. В условиях ФАП можно лечить
 - а) острый метроэндометрит
 - б) острый аднексит
 - в) кистому яичника
 - г) вульвовагинит
5. Терапевтические мероприятия, применяемые при остром аднексите
 - а) введение сокращающих препаратов
 - б) горячие спринцевания
 - в) физиотерапевтические процедуры
 - г) антибактериальная терапия
6. При подозрении на нарушенную внематочную беременность проводят
 - а) пункцию через задний свод влагалища
 - б) зондирование полости матки
 - в) гистеросальпингографию
 - г) кольпоскопию
7. Лечебная тактика при септическом аборте
 - а) тепловые процедуры
 - б) удаление матки
 - в) срочное выскабливание полости матки
 - г) орошение по Снегиреву
8. Пункция через задний свод влагалища показана при подозрении на

- а) эндометриоз
 - б) аднексит
 - в) прервавшуюся трубную беременность
 - г) эндометрит
9. Гематометра — это скопление крови
- а) в трубе
 - б) в полости матки
 - в) во влагалище
 - г) в шейке
10. Осложнение искусственного медицинского аборта
- а) развитие эндометриоза
 - б) развитие цистита
 - в) перфорация стенки матки
 - г) развитие бартолинита
11. Для подростков, не живущих регулярной половой жизнью, рекомендуется контрацепция
- а) гормональные таблетки
 - б) презерватив
 - в) шеечные колпачки
 - г) физиологический метод
12. Гинекологические заболевания, являющиеся причиной наружных кровотечений
- а) апоплексия яичника
 - б) рак эндометрия и шейки матки
 - в) нарушенная внематочная беременность
 - г) рак яичников
13. Внематочная беременность не может локализоваться в
- а) яичниках
 - б) шейке матки
 - в) матке
 - г) трубах
14. Причинами внематочной беременности являются
- а) генитальный инфантилизм
 - б) длительная гормональная терапия
 - в) редкие половые контакты
 - г) миома матки
15. Основным клиническим симптомом прерывающейся внематочной беременности по типу трубного аборта
- а) частые болезненные мочеиспускания
 - б) мажущие кровянистые выделения из половых путей
 - в) нарушение зрения
 - г) головные боли