

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №11. Лечение фоновых и предраковых заболеваний ЖПО. Доброкачественные опухоли матки. Лечение злокачественных опухолей. Эндометриоз.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1. Тяжелая дисплазия шейки матки — это
 - а) предрак
 - б) начальная форма рака
 - в) фоновый процесс
 - г) дисгормональная гиперплазия
2. При нулевой стадии рака шейки матки у молодых больных показана
 - а) экстирпация матки с придатками
 - б) экстирпация матки без придатков
 - в) криодеструкция
 - г) электроконизация
3. При нулевой стадии рака шейки матки после 50 лет показана
 - а) экстирпация матки без придатков
 - б) экстирпация матки с придатками
 - в) криодеструкция
 - г) электроконизация
4. При перекруте ножки опухоли яичника наблюдаются
 - а) повышение АД, тахикардия
 - б) клиника «острого живота»
 - в) положительный симптом Пастернацкого
 - г) нарушение мочеиспускания
5. Наиболее часто хориокарцинома возникает после
 - а) абортов
 - б) пузырного заноса
 - в) нормальных родов
 - г) преждевременных родов
6. Основное клиническое проявление при раке шейки матки
 - а) вздутие кишечника
 - б) нарушение акта мочеиспускания
 - в) контактные кровотечения
 - г) резко выраженный лейкоцитоз в крови
7. Для уточнения диагноза рака шейки матки применяют следующий метод исследования
 - а) гистеросальпингографию
 - б) ультразвуковое исследование
 - в) исследование влагалищного мазка
 - г) биопсию с гистологическим исследованием
8. Лечебная тактика при доброкачественных новообразованиях яичников
 - а) диспансерное наблюдение
 - б) противовоспалительная терапия

- в) ампутация матки с придатками
 - г) удаление опухоли с резекцией пораженного яичника
9. Разновидность кистом яичников
- а) параовариальная
 - б) фолликулярная
 - в) псевдомуцинозная
 - г) лютеиновая
10. Разновидность ретенционных кист женских половых органов
- а) фолликулярная
 - б) папиллярная
 - в) псевдомуцинозная
 - г) дермоидная
11. Признаки, характерные для субмукозной миомы матки
- а) обильные болезненные менструации
 - б) субфебрильная температура тела
 - в) межменструальные кровянистые выделения
 - г) нарушения функций соседних органов
12. Признак, по которому можно заподозрить рак яичника
- а) аменорея
 - б) жидкий стул
 - в) тонкостенное образование с гладкой поверхностью
 - г) быстрый рост опухоли
13. Признак, позволяющие заподозрить рак тела матки
- а) пенистые выделения из влагалища
 - б) высокая температура
 - в) кровотечение в менопаузе
 - г) боли в эпигастральной области
14. Предраковые состояния шейки матки
- а) истинная эрозия шейки матки
 - б) недоразвитие шейки матки
 - в) дисплазия многослойного эпителия
 - г) эндоцервицит
15. Характерная особенность миомы матки
- а) доброкачественная опухоль матки
 - б) злокачественная опухоль
 - в) опухоль, исходящая из эпителиальной ткани
 - г) опухолеподобное образование
16. Острый живот при кистомах яичников может возникнуть в результате
- а) перекрута ножки кистомы
 - б) сдавления соседних органов
 - в) роста опухоли
 - г) образования метастазов
17. Тактика лечения при кистомах яичников

- а) гормональная терапия в течение 2-3 месяцев
 - б) противовоспалительная терапия
 - в) оперативное лечение в плановом порядке
 - г) физиотерапевтическое лечение
18. Особенность папиллярной кистомы
- а) чаще поражает один яичник
 - б) чаще встречается в детском возрасте
 - в) слизеподобное содержимое
 - г) преобладание процесса пролиферации клеток
19. Характерная особенность псевдомуцинозной кистомы
- а) киста небольших размеров, содержимое желтого цвета
 - б) имеет единичные сосочки
 - в) киста гигантских размеров, ячеистое строение, содержимое слизеподобное
 - г) чаще встречается в юном возрасте
20. Эндометриоз
- а) разрастание эндометриоидноподобной ткани за пределами обычной локализации эндометрия
 - б) возникает на фоне воспалительных процессов
 - в) встречается у женщин в периоде менопаузы
 - г) часто возможна малигнизация