

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи

Занятие №12. Хирургические методы лечения гинекологических больных.

Предоперационная подготовка.

Тесты (выберите один правильный вариант).

1. Причинами внематочной беременности являются
 - а) генитальный инфантилизм
 - б) длительная гормональная терапия
 - в) редкие половые контакты
 - г) миома матки
2. Основным клиническим симптом прерывающейся внематочной беременности по типу трубного аборта
 - а) частые болезненные мочеиспускания
 - б) мажущие кровянистые выделения из половых путей
 - в) нарушение зрения
 - г) головные боли
3. Симптомом внематочной беременности, прерывающейся по типу трубного аборта не может быть
 - а) скудные кровянистые выделения из половых путей
 - б) боли внизу живота и в паховой области
 - в) увеличенные и болезненные придатки
 - г) нарушение мочеиспускания
4. Симптомом внематочной беременности, прерывающейся по типу разрыва маточной трубы, не может быть
 - а) внезапный приступ болей
 - б) иррадиация боли в прямую кишку
 - в) тахикардия
 - г) повышение АД
5. Тактика лечения прервавшейся трубной беременности
 - а) наблюдение дежурной медицинской сестры
 - б) срочное оперативное вмешательство
 - в) применение сокращающих средств, холод на низ живота
 - г) холод на низ живота, наркотики
6. Мероприятие при подозрении на внематочную беременность
 - а) срочная госпитализация
 - б) введение обезболивающих средств
 - в) амбулаторное наблюдение
 - г) антибактериальная терапия
7. Наиболее информативный метод диагностики трубной беременности
 - а) пробное выскабливание полости матки
 - б) бимануальное исследование
 - в) лапароскопия
 - г) гормональные тесты
8. Признаки, характерные для апоплексии яичника

- а) начало заболевания в первые дни после менструации
 - б) кровянисто-гнойные выделения из половых путей
 - в) задержка менструации
 - г) острые боли внизу живота
9. Аборт по желанию женщины производится на сроке беременности до
- а) 23 недель
 - б) 12 недель
 - в) 16 недель
 - г) 10 недель
10. Мини аборт производится на сроке беременности до
- а) 1-2 недель
 - б) 4 недель
 - в) 7 недель
 - г) 12 недель
11. Несостоявшийся аборт-это патологический процесс, когда
- а) плодное яйцо начинает отслаиваться
 - б) плод погиб, а матка не возбуждается
 - в) в полости матки задержались части плодного яйца
 - г) наступила угроза отслойки плодного яйца
12. Для аборта в ходу характерно
- а) пальпация полюса плодного яйца в шейном канале
 - б) тянущие боли внизу живота
 - в) незначительное кровотечение
 - г) матка по размерам соответствует сроку беременности
13. Тактика лечения при аборте в ходу
- а) выскабливание полости матки
 - б) назначение витамина Е
 - в) введение седативных препаратов
 - г) введение наркотиков
14. Тактика лечения при угрожающем аборте
- а) обезболивающие
 - б) спазмолитики
 - в) сокращающие средства
 - г) слабительные средства
15. Для осложненного инфицированного аборта характерны
- а) температура в норме
 - б) изменения в матке, параметральной клетчатке
 - в) симптомы разлитого перитонита
 - г) гнойные очаги воспаления в легких