

**Занятие №3. Оказание помощи при физиологических родах. Ведение родов.
Гипоклапсия плода. Нормальный послеродовой период.**

Тесты

1 подгруппа

1. Трубный аборт возникает при имплантации плодного яйца в части маточной трубы
 - а) истмической
 - б) интерстициальной
 - в) ампулярной
 - г) интрамуральной
2. Основной метод лечения внематочной беременности
 - а) антибиотикотерапия
 - б) оперативный
 - в) консервативный
 - г) применение цитостатиков
3. Искусственный аборт — это прерывание беременности на сроке до
 - а) 15 недель
 - б) 12 недель
 - в) 10 недель
 - г) 8 недель
4. Привычный выкидыш — это аборт
 - а) на раннем сроке беременности
 - б) по медицинским показаниям
 - в) криминальный
 - г) самопроизвольный два и более раз
5. При лечении невынашивания беременности эффективен препарат
 - а) метионин
 - б) хлористый кальций
 - в) гинипрал
 - г) метронидазол
6. Симптомы угрожающего выкидыша
 - а) отсутствие роста матки
 - б) изменение сердцебиения плода
 - в) маточное кровотечение
 - г) повышение тонуса матки, боли в животе
7. При лечении истмико-цервикальной недостаточности более рационально применять
 - а) сульфат магния
 - б) туринал
 - в) наложение швов на шейку матки
 - г) физиолечение
8. После самопроизвольного выкидыша рекомендуется применять с целью контрацепции
 - а) ВМС
 - б) презерватив
 - в) фарматекс
 - г) гормональные таблетки

9. Преждевременные роды — это роды на сроке (в неделях)
- а) 22-38
 - б) 28-35
 - в) 22-32
 - г) 30-35
10. Масса недоношенного плода (в граммах)
- а) 2700
 - б) 2600
 - в) 5300
 - г) до 2500
11. При многоплодной беременности однойцевые близнецы развиваются в результате
- а) оплодотворения двух яйцеклеток
 - б) созревания двух фолликулов
 - в) полного разделения зиготы
 - г) овуляции в двух яичниках
12. При многоплодной беременности наиболее грозным осложнением является
- а) многоводие
 - б) сцепление близнецов головками
 - в) слабость родовой деятельности
 - г) малый вес плода
13. При тазовых предлежаниях сердцебиение выслушивается
- а) ниже пупка
 - б) выше лона
 - в) выше пупка
 - г) на уровне пупка
14. При тазовых предлежаниях головка прорезывается размером
- а) средним косым
 - б) вертикальным
 - в) прямым
 - г) малым косым
15. При тазовых предлежаниях плод испытывает гипоксию с момента
- а) рождения туловища
 - б) рождения до пупочного кольца
 - в) при врезывании ягодиц
 - г) при рождении до углов лопаток

1 в, 2 б, 3 б, 4 г, 5 в, 6 г, 7 в, 8 г, 9 а, 10 г, 11 в, 12 б, 13 в, 14 г, 15 б,