

Занятие №3. Оказание помощи при физиологических родах. Ведение родов.

Гипоклапсия плода. Нормальный послеродовой период

Тесты

2 подгруппа

1. В течение послеродового периода нужно уделять особое внимание
 - а) профилактике мастита
 - б) профилактике кариеса
 - в) уходу за кожей рук
 - г) психическому состоянию роженицы
2. Вакцинация БЦЖ новорожденному проводится на
 - а) 5 день
 - б) 3 день
 - в) 4 день
 - г) 10 день
3. Кефалогематома — это
 - а) отек мягких тканей головки
 - б) кровоизлияние в подкожной клетчатке
 - в) кровоизлияние под надкостницу
 - г) скопление крови в мозговой ткани
4. Родовая опухоль — это
 - а) смещение костей черепа плода
 - б) отек мягких тканей головки
 - в) кровоизлияние мягких тканей головки
 - г) опухоль костей черепа
5. При гемолитической болезни наиболее рационально
 - а) раннее прикладывание к груди
 - б) назначение фенobarбитала
 - в) применение массажа
 - г) заменное переливание крови
6. Для профилактики гонобленореи применяется
 - а) 30% раствор сульфацила натрия
 - б) 19% раствор альбуцида
 - в) 1% раствор альбуцида
 - г) 0,9% физиологический раствор
7. Противопоказание к продолжению беременности при митральном стенозе:
 - а) ревматизм в неактивной фазе
 - б) комиссуротомия 5 лет назад
 - в) появление мерцательной аритмии и признаков сердечной недостаточности
 - г) появление отеков
8. Для диагностики пузырного заноса подтверждением является
 - а) большой размер матки
 - б) кровотечение
 - в) высокий уровень хорионического гонадотропина
 - г) шевеление плода

9. Признаком внутриутробной гипоксии является
 - а) шум пуповины
 - б) учащение сердцебиения плода свыше 160 уд. в минуту
 - в) выслушивание сердцебиения плода ниже пупка
 - г) отсутствие шевеления плода
10. При разрыве маточной трубы кровь скапливается
 - а) во влагалище
 - б) в переднем своде влагалища
 - в) в дугласовом пространстве
 - г) в пузырно-маточном пространстве
11. При трубной беременности менструации
 - а) отсутствуют
 - б) циклические
 - в) ациклические
 - г) нерегулярные
12. Симптомы трубного аборта
 - а) внутреннее кровотечение
 - б) схваткообразные боли внизу живота
 - в) метеоризм
 - г) обильное, длительное кровотечение из половых путей
13. При лечении внематочной беременности препарат метотрексат целесообразно вводить
 - а) внутривенно
 - б) в цервикальный канал
 - в) в место имплантации
 - г) в виде таблеток
14. Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке
 - а) 10-12 недель
 - б) 2-3 недели
 - в) 5-6 недель
 - г) 8-9 недель
15. При шеечной беременности шейка матки
 - а) бочкообразной формы
 - б) в норме
 - в) округлой формы
 - г) конической формы