

ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Пример профессиональной задачи №2.

Обратился больной К., по поводу резкой загрудинной боли сжимающего характера. Боль возникла после тяжелой физической нагрузки, продолжалось около 7 минут, прошла самостоятельно. Такой же приступ был 2 недели назад, к врачу не обращался.

Объективно: тоны сердца громкие, пульс 78 уд./мин, удовлетворительного наполнения, АД 160/90 мм рт.ст.

Задание. Провести измерение артериального давления.

Примерный оценочный лист профессиональной задачи инвариантной части практического задания II уровня

«Измерение артериального давления»

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления
Подготовка к процедуре		
1.	Проверить исправность прибора для измерения артериального давления (тонометра) в соответствии с инструкцией по его применению. «Проверить исправность прибора для измерения артериального давления (тонометра) в соответствии с инструкцией по его применению, находится в рабочем состоянии».	Сказать
2.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль. «Здравствуйте, я фельдшер _____ (указать номер жеребьевки). Вам необходимо провести процедуру измерения артериального давления».	Сказать
3.	Попросить пациента представиться. «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?».	Сказать
4.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. «Пациент идентифицирован в соответствии с медицинской картой стационарного больного (003-У)».	Сказать
5.	Сообщить пациенту о назначении врача.	Сказать

	«Вам назначена процедура измерения артериального давления».	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. «У Вас нет возражений на выполнение данной процедуры?» «Возражений пациента на выполнение процедуры нет».	Сказать
7.	Объяснить ход и цель процедуры. «Контроль артериального давления необходим для определения дальнейшей тактики».	Сказать
8.	Накрыть кушетку одноразовой простыней.	Выполнить
9.	Предложить (помочь) пациенту занять удобное положение на кушетке лежа на спине нижние конечности не скрещены, руки разогнуты. «Вам необходимо лечь удобно или я могу Вам в этом помочь, ноги и руки выпрямить. Во время проведения процедуры не разговаривать, не делать резких движений».	Выполнить/Сказать
10.	Проверить герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки. «Герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки не нарушена. Визуальная целостность упаковки одноразовой антисептической салфетки сохранена».	Выполнить/Сказать
11.	Проверить срок годности одноразовой антисептической салфетки. «Срок годности соответствует сроку хранения».	Выполнить/Сказать
12.	Обработать руки гигиеническим способом. «Обрабатываю руки гигиеническим способом».	Сказать
13.	Надеть нестерильные перчатки.	Выполнить
14.	Освободить от одежды руку пациента выше локтевого сгиба, оставив один тур одежды или положив одноразовую салфетку. «Освободите от одежды руку выше локтевого сгиба или я могу Вам помочь».	Выполнить/Сказать
15.	Расположить руку пациента на уровне сердца ладонью вверх.	Выполнить
16.	Определить размер манжеты. «Размер манжеты соответствует обхвату плеча пациента».	Сказать
Выполнение процедуры		
17.	Наложить манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) на плечо пациента.	Выполнить
18.	Проверить, что между манжетой и поверхностью плеча помещается два пальца.	Выполнить
19.	Убедиться, что нижний край манжеты располагается на 2,5 см выше локтевой ямки. «Нижний край манжеты располагается на 2,5 см	Выполнить/Сказать

	выше локтевой ямки».	
20.	Поставить два пальца левой руки на предплечье в области лучезапястного сустава в месте определения пульса. «Определяю пульс на лучевой артерии».	Выполнить/Сказать
21.	Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального давления (тонометра).	Выполнить
22.	Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для измерения артериального давления (тонометра) до исчезновения пульса в области лучезапястного сустава.	Выполнить
23.	Зафиксировать показания прибора для измерения артериального давления (тонометра) в момент исчезновения пульса в области лучезапястного сустава. «Нагнетаю воздух до исчезновения пульса. В момент исчезновения пульса артериальное давление равно (называет показатель давления)».	Сказать
24.	Спустить воздух из манжеты прибора для измерения артериального давления (тонометра).	Выполнить
25.	Мембрану фонендоскопа поместить у нижнего края манжеты над проекцией локтевой артерии в области локтевой впадины, слегка прижав к поверхности тела.	Выполнить
26.	Повторно накачать манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) до уровня, превышающего полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт.ст. «Накачиваю манжету на 30 мм рт. ст. выше предыдущего показателя».	Выполнить/Сказать
27.	Сохраняя положение фонендоскопа, медленно спустить воздух из манжеты.	Выполнить
28.	Фиксировать по шкале на приборе для измерения артериального давления (тонометре) появление первого тона Короткова - это значение систолического давления. «Систолическое давление равно..... (называет показатели давления)».	Выполнить/Сказать
29.	Фиксировать по шкале на приборе для измерения артериального давления (тонометре) прекращение громкого последнего тона Короткова - это значение диастолического давления. «Диастолическое давление равно..... (называет показатели давления)».	Выполнить/Сказать
30.	Для контроля полного исчезновения тонов продолжать аускультацию до снижения	Выполнить/Сказать

	давления в манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно последнего тона. «Убеждаюсь в полном исчезновении тонов.....».	
31.	Выпустить воздух из манжеты.	Выполнить
32.	Снять манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) с руки пациента.	Выполнить
33.	Сообщить пациенту результат измерения артериального давления. «Ваше артериальное давление равно.....» (называет показатели давления).	Сказать
34.	Уточнить у пациента о его самочувствии. «Как вы себя чувствуете?». «Пациент чувствует себя удовлетворительно».	Сказать
35.	Помочь пациенту подняться с кушетки. «Можно вставать. Нужна ли Вам моя помощь?».	Сказать
Завершение процедуры		
36.	Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с антисептиком одноразовую.	Выполнить
37.	Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком одноразовой в ёмкость для медицинских отходов класса «А».	Выполнить
38.	Обработать (протереть) мембрану и оливы фонендоскопа салфеткой с антисептиком одноразовой.	Выполнить
39.	Утилизировать салфетку с антисептиком одноразовую в ёмкость для медицинских отходов класса «Б».	Выполнить
40.	Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость для медицинских отходов класса «Б».	Выполнить
41.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить
42.	Обработать руки гигиеническим способом. «Обрабатываю руки гигиеническим способом».	Сказать
43.	Записать результаты в медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях (форма 003/у).	Выполнить
Итог по практическим действиям:		
Штрафные целевые индикаторы		
1.	Нарушение последовательности выполнения алгоритма одно – 1 балл два – 2 балла три и более – 5 баллов	
Итого по штрафным индикаторам:		
ИТОГО за выполнение задания:		